

Orientacyjna zawartość azotu w odchodach różnych zwierząt (w nawozach naturalnych)

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 (Dz. U. Nr 93 poz. 780).

Rodzaj zwierząt	System utrzymania							
	Głęboka ściółka		Płytką ściółką				Bezściółkowo	
	Prod. obornika t/rok	Zaw. N w kg/t obornika	Prod. obornika t/rok	Zaw. N w kg/t obornika	Prod. gnojówki m3/rok	Zaw.N w kg/m3 gnojówki	Prod. gnojowicy m3/rok	Zaw.N w kg/m3 Gnojowicy
Knury	6,5	3,5	3,2	2,1	2,9	3,3	4,6	4
Maciory	7	3,7	3,7	2,2	3,6	3,4	4,6	4,2
Warchlaki 2-4 m-ce	2,5	2	0,1	0,5	1,1	0,8	1,7	1,6
Prosięta do 2m-ca	1,2	0,05	0,2	0,01	0,9	0,02	0,5	1,4
Tuczniki	2,4	2,4	2,5	2,4	2,2	3,6	3,5	3,6

Objaśnienia do tabeli:

Podane w tabeli ilości obornika, gnojówki i gnojowicy produkowanych przez poszczególne rodzaje zwierząt oraz zawartość azotu w oborniku, gnojówce i gnojowicy są wielkościami średnimi.

Ilość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych przez poszczególne rodzaje zwierząt oblicza się na podstawie następującego wzoru: **liczba zwierząt według średniego stanu rocznego x produkcja obornika lub gnojówki lub gnojowicy x zawartość azotu.**