

Kraina	Lesistość	Klimat	Siedliska	Gatunki
I	30,5%	- klimat bałtycki- pobraża - klimat Krainy Wielkich Dolin- SE - klimat Pojezierza Pomorskiego Generalnie wpływy morskie- klimat łagodny	Wszystkie nizinne typy, przy czym ponad 60% to Bśw i BMśw.	Charakterystycznym gatunkiem jest <u>buk</u> tworzący d- stany jednogatunkowe i mieszane. Podstawowe gatunki lasotwórcze to So (70%), Db i niewielka ilość Św.
II	31,6%	- typ klimatu pojeziernego - ścieranie się wpływów atlantyckich i kontynentalnych - wyraźny wzrost kontynentalizmu w kierunku E - klimat wilgotny i surowy	Wszystkie nizinne typy prócz Lł. Dominuje Bśw.	Charakterystycznym gatunkiem jest <u>świerk</u> . Pojawia się tu prawie na wszystkich siedliskach. Gatunki lasotwórcze to: So (65%), Św i Ol. Inna nazwa to kraina borów świerkowych i świerkowo- mieszanych
III	30,3%	- klimat Wielkich Dolin - we wschodniej części pewne cech klimatu kontynentalnego - względnie łagodny i ciepły, na NE nieco surowszy	Pełen przekrój typów nizinnych. Bory 63%, co stanowi największy udział spośród wszystkich krain.	Kraina <u>rozproszonego występowania buka</u> . Na żyznych siedliskach występuje zarówno Bk jak i Db. Gatunki lasotwórcze to: So (87%), oba Db, Ol, Bk.
IV	19,6%	- E część regionu klimatycznego Wielkich Dolin - względnie ciepły latem, dość surowy zimą - w NW części kraina leży na obszarze minimum opadowego	Wszystkie nizinne typy. W S części dominują typy mocniejsze BM i LM	<u>Brak Bk, Św i Jd</u> Gatunki lasotwórcze: So (75%), Ol, Db i Js. D-stany o zróżnicowanym składzie gatunkowym.
V	26,3%	- typ klimatu podgórskich nizin i kotlin - wpływy atlantyckie od NW malejące ku E - opady dość wysokie	Pełen przekrój typów nizinnych. Wysoki udział siedlisk wilgotnych- 25%	Na obszarze całej krainy <u>występują Św, Jd i Bk</u> . Generalnie spotkamy tu wszystkie gospodarczo ważne gatunki. Charakterystyczne jest również występowanie oprócz sośnin, litych świerczyn i dąbrów
VI	24,2%	- klimat zróżnicowany: klimat Krainy Wielkich Dolin, klimat wyżyn środkowych i klimat podgórskich nizin i kotlin	Wszystkie nizinne typy oraz typy wyżynne, a także górskie (dzielnica Gór	Oprócz d- stanów sosnowych występują tu także <u>d- stany dębowe, jodłowe i bukowe</u> (<u>kraina gromadnego występowania Jd i</u>

		- opady dość wysokie	Świętokrzyskich). Dość duży udział typów LM i L.	<u>Bk</u> . Udział Św jest bardzo mały.
VII	38%	- klimat górski - zróżnicowany w zależności od wysokości - wysoka suma opadów rocznych	Pełna siatka typów górskich, przy czym dominuje BMG i LMG (prawie 60%)	<u>Gromadne występowanie Św (72%!!)</u> . Jodła występuje tu sporadycznie. Duży udział mają także Db i Bk.
VIII	41,4%	- klimat górski - zróżnicowany w zależności od wysokości - wysoka suma opadów rocznych	Wszystkie podgórskie i górskie typy, a także w niewielkich ilościach typy nizinne. LG (prawie 55%), Lwyż (26%)	<u>Gromadne występowanie Jd i Bk</u> na żyzniejszych siedliskach. Uboższe zajmuje Św. Gatunki lasotwórcze to: Jd, Bk i Św (razem 72%) oraz So