

Na lód wychodzę tylko w ponie białej kombinezonu
sute, nie przepuszczającej wody, silnie natłuszczo-
ne. Inny palec kończyłyby się w wodzie i
w mrozie i sprze pięć stron pływają.

Do wata 60 - 95 cm kamieszki antycenne wy-
biera Eurody i Ameryki Półn. Wodowne. Po-
zywnie: ryby, skorupniki, mięsaki, owady.
Samice młode przeważnie 2 sioły. Wyraźnie sa-
mice i samice na zimę. Zagniewdowniki 3
rodziny mrowate w Polsce występują:

- 1) Mur czarny - nadle białe i pniełny
- 2) Mur mławy - } nadle - pniełny
- 3) Mur łodowiec

Wszystkie mury objęte są ochroną gat.

Lamie along perimeter
mice i samica na zmiary. Zagnardowniki
wskazy mironate w Polsce występuj.
1) Kier czapury - radła - gony - przedny
2) Kier nleawory - } radłne - przednie
3) Kier udowec
Hypothic nury objte ze atnong gat.

Repd : Perkosowate Podicipediformes

Plaki wodne, znakomicie pływające i unoszące
Kształt palec nogi zaopatrzony w obrotowe strumienie
błony pływne w postaci różnorodnych, ciętobiegłych pól
skórzanych. Brak sterczek w opowie. Dł. ciała 22-30 cm
mieszkań wody słodkie niemal całej kuli ziemskiej
lasy, daleka północ i wyspy azjatyckie. Zwykle gat
wodowne. Rozmnożenie: ryby, płazy i ich larwy, ślim
paki, mięczaki, owady i roztoczki. Składają 3-9 p
wątłych. Wzrostu obce roztoczki. Zagniewadowniki.

W Polsce występuje 5 gat. sadzejki podobne *Piticeps*

- 1) Parkorek - doic pozpobity, legany i prelotny
2. - " - zausznuu - " - " - " - "
- 3 - " - rogaty - prelotny
- 4 - " - nduonyi legany, prelotny
- 5 - " - dwucmby - doic liany prelotny. legany

mieszkają wady szarych
 (wys.) daleka północ, wypry, ptery, ich brzozy, sz
 wodowne. Polymery: ryby, ptery, składowe 3-9,
 piala, mifunili, awady i wolizine. Składowe 3-9,
 o. atych. Wsiadają oboje rąbce. Zagniewdownili.
 W Polsce wypry 5 gat. rąbce perhor Paticeps
 1) Parkorek - dość pospolity, legony, prelotny
 2. - " - causeria
 3. - " - rogaty - prelotny
 4. - " - rdzawony legony, prelotny
 5. - " - dwuciany - dość liczny prelotny. leg

Rząd : Burykowate / Parhonorze

Oceaniczne, doskonałe wtopce, nie legone
 w pory legony. Walec i albatrosy, burski.
 Tunki i murce. Gniardownili, wodowne

Rząd : Wiosnomogie Pelecani'formes.

Imaciej petiole. Europejskie se przedstawiają walcowate pływają i nurkują (wył. petiolary) konium tylne kształtu. Włoszatego. 4 palce spide słone pływ. Kosi - silnie spneumatyzowany. Grucioł leprawy silnie rozwinęty. Wzrostowe se znacząco wyrażają. Wzrostowe w zohyleniu ryb. Kosi to rodziny: faktory, petiolary, gładzaki, hormony, wprawy i frugaty.

W Polsce: 2 rodziny petiolanowate relatywne petiolan baba 2 rodziny hormonomowate wył. pływ 2 gat. legowy - hormony ciemny. Obie te gat. se chromione.

page 12 chromione koronowan ciemny oba te gat

L. 96

22 XII 87r

Temat: Charakterystyka rodzaju brodzica i jego przedstawicieli

Rząd: Brodzice Ciconiiformes.

234-239

Mocniej szerokołonegi (Gressores). Ptaki długodługo-
i o długim dziobie. Koniuczny tylny typ brodzicy.
Którąś dolnej brzo lub silnie umiarkowana, wsta-
tek czego mają ograniczone możliwości wydłużania
głównie. Wzrostnie gniazdowiczki opiera ciemnowłosy
Przynajmniej wyjątkowo ciemne. Któryś to Frater:
czaple, niojadły, trawikodzioby, wangi, ciemny li-
ny, ciemnowłosy.

W Polsce występują przedstawiciele rodzin:

1. Czaple (czapla nawa, czapla purpurowa, cz. modra i biała, czapla modrona, ilekroć, biał. brzo-
czka).
2. Bociany (bocian biały i b. ciemny czyli raptus).

L. 97 98

Temat: Charakterystyka rodzaju blaskodłabe i jego przedstawicieli